

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

**BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, Route de la FORET - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 58.39.02

ABONNEMENT ANNUEL 70 F.

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
13, Rte de la Forêt - Biard - 86000 POITIERS

BULLETIN n° 191 (Edition Générale n° 3/81) du 9.3.81

TRAITEMENTS DE PREDEBOURREMENT

ARBRES FRUITIERS

Les produits cités dans notre bulletin n°189 pour lutter contre les formes hivernantes de nombreux parasites ne sont plus utilisables dès les premiers signes du débourrement en raison des risques de phytotoxicité. Il est possible, par contre, si le traitement d'hiver n'a pas été effectué, d'appliquer l'une des matières actives suivantes :

- * oléoparathion = 45 g + 1 l. d'huile/hl (nombreuses spécialités)
- * oléomalathion = 300 g + 2 l. d'huile/hl (" ")
- * oléodiazinon = 130 g + 2 l. d'huile/hl (BASUDINE 20)
- * oléoparathion + lindane = 45 g + 60 g + 0,75 l. d'huile/hl (TYPHOLINE GAMMA50)

CLOQUE DU PECHER

Nous rappelons qu'il est impératif de débiter la lutte au stade B à l'aide de l'une des matières actives citées dans notre bulletin n°190. Or, ce stade est atteint ou le sera très vite du fait du réchauffement actuel - Assurer le renouvellement en fonction de la pluviométrie.

ANTHONOME DU POMMIER

Ce charançon a été signalé, durant la campagne passée, dans de nombreux vergers, provoquant des dégâts sur fleurs du type "Clou de girofle" c'est-à-dire que les fleurs ne s'ouvrent pas et les pétales se dessèchent. Les bourgeons à fruits du pommier sont particulièrement attractifs quand entre les écailles, apparaissent des tissus végétaux de coloration vert blanchâtre. Si les traitements de prédebourrement avec l'un des produits cités plus haut sont actifs contre l'anthonome, il n'en reste pas moins qu'un traitement au stade C avec du lindane à raison de 20 g de m.a/hl est la méthode la plus efficace.

GNOMONIA DU CERISIER

Cette maladie, présente sur de nombreux cerisiers dans notre région, se manifeste par des feuilles desséchées et enroulées qui restent fixées à l'arbre durant tout l'hiver et même jusqu'à l'été. Il convient d'éliminer les feuilles malades à partir desquelles l'infection se réalise au printemps et réaliser un programme de lutte comportant deux traitements :

- * un premier au gonflement des bourgeons à l'aide d'un produit cuprique.
- * un second après la chute des pétales avec des produits à base de manèbe ou de mancozèbe (160 g. de m.a/hl).

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"Poitou-Charentes" :

R. GUILLEMENET.

Précédente note : n°190 du 24.2.81

Imprimé à la Station le 9.3.81 -

7 435